

DODATAK ISHRANI, OLAKŠAVA VARENJE, KOD MUČNINE

Antimetil®

Antimetil® sadrži kao aktivni sastojak ekstrakt rizoma đumbira, koji olakšava varenje.

Antimetil® se može koristiti u slučaju preko-mernog unosa hrane, narušavanja uobičajenih navika ishrane (npr. na odmoru), kod jutarnjih mučnina, tokom putovanja

Mali savet ako idete na put: stavite u torbu neku količinu **Antimetil®**-a pre nego što krenete.

SASTAV PROIZVODA

1 film-tableta sadrži: suvi ekstrakt rizoma đumbira (*Zingiber officinale* Roscoe, Zingiberaceae), standardizovan na 10% gingerola 50,00mg

SASTOJCI

Mikrokristalna celuloza (sredstvo za povećanje zapremine), suvi ekstrakt rizoma đumbira, hidroksipropilmetil-celuloza (sredstvo za oblaganje), silicijum-dioksid (sredstvo protiv zgrudnjavanja), kalcijum karbonat (sredstvo za oblaganje), polidekstroza (sredstvo za oblaganje), magnezijumove soli masnih kiselina (sredstvo protiv zgrudnjavanja), talk (sredstvo protiv zgrudnjavanja), maltodekstrin, trigliceridi srednjeg lanca, bakarni kompleksi hlorofilina (boja).

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE: PO POTREBI

DECA OD 3 DO 5 GODINA
1 ○ tableta 1-2 puta dnevno (najviše 2 tablete)
DECA OD 6 DO 11 GODINA
1 ○ tableta 1-4 puta dnevno (najviše 4 tablete)
ODRASLI I DECA PREKO 12 GODINA
2 ○ tablete 2 puta dnevno
TRUDNICE OD 1. MESECA
1 ○ tableta ujutro i u podne (najviše 2 tablete)



Popiti tablete sa vodom.

Kod putovanja, popiti tabletu 30 minuta pre polaska.

KONTRAINDIKACIJE: preosetljivost na sastojke rizoma đumbira.

POSEBNA UPOZORENJA:

Zbog holagognog efekta, koren đumbira ne bi trebalo da uzimaju pacijenti sa kamenom u žučnoj kesi, osim ako to ne odobri lekar, kao ni pacijenti sa poremećajima koagulacije krvi, ili oni koji su na terapiji antikoagulansima. Ne preporučuje se dojiljama. Kod preosetljivih osoba moguća je pojava dermatitisa.

NAPOMENE:

Pre upotrebe proizvoda, posavetovati se sa lekarom ili farmaceutom.

Primena kod dece mlađe od 6 godina i trudnica, po savetu lekara, pedijatra ili ginekologa. Proizvod se primenjuje po potrebi, pola sata pre putovanja, ne duže od 5 dana. Kod nadimanja ne koristiti duže od dve sedmice. Dijetetski proizvod nije zamena za uravnoteženu ishranu. Preporučena dnevna doza se ne sme prekoračiti. U slučaju pojave reakcije preosetljivosti obustaviti dalju primenu. Čuvati van domašaja dece.

Čuvanje:

proizvod čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi ispod 30°C.

Proizvođač:

Tilman SA, Z.I. Sud 15, B-5377 Baillonville, Belgija

Nosilac upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS: Ewopharma d.o.o. Borislavjevičeva 78, 11010 Beograd, Republika Srbija

Broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva zdravlja RS:

Pakovanje sa 18 film tableta: 20163/2021 od 29.12.2021.

Pakovanje sa 36 film tableta: 20164/2021 od 29.12.2021.



Tilman®

Dodatak ishrani



www.antimetil.rs

CUTTING DIE PLAN & TECHNICAL SPECIFICATIONS			
TYPE	Paper leaflet		
HxL (mm)	135 x 210 mm / Folded 35(-2)x135		
Support	50 g/m ²		
Supplier(s)	LGR Goldprint, Musch	Date	06/09/2017
LEGEND			
COLOURS	CMYK File, PANTONE on request		